

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів


# РАК ШЛУНКА З ВИСОКИМ РИЗИКОМ ІНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ПРОГРЕСУВАННЯ: ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ



Р.Р. Ярема, М.Т. Фецич

Адреса:

Ярема Роман Романович  
79000, Львів, вул. Пекарська, 69  
Львівський національний медичний  
університет ім. Данила Галицького,  
кафедра онкології та медичної радіології  
Тел.: (032) 295-37-61, (067) 940-69-33  
E-mail: yaremarom@rambler.ru



**Ключові слова:** рак шлунка, інвазія серозної оболонки, метакронний карциноматоз очеревини, фактори ризику.

...через два місяця у больно́й обнаружено сплошное просовидное обсеменение всей париетальной брюшины и брыжеек, чего ни малейших следов я не видел при первой операции.  
С.С. Юдин (1952)

Проаналізовано віддалені результати хірургічного лікування 57 хворих на рак шлунка з інвазією серозної оболонки. Встановлено несприятливий прогноз для пацієнтів даної категорії — медіана загальної та безрецидивної тривалості життя становлять 19 та 15 міс відповідно. Встановлено, що найчастішим шляхом метакронного метастазування «серозоінвазивного» раку шлунка є імплантаційна дисемінація, котру діагностовано у 47,4% хворих та у 81,8% хворих з прогресуванням захворювання. Локалізація пухлини, тип росту пухлини за Borjmann, гістологічна форма пухлини та площа ураження серозної оболонки шлунка пухлиною визначені як достовірні предиктивні фактори метакронного карциноматозу очеревини у хворих на «серозоінвазивний» рак шлунка.

## ВСТУП

Місцево-поширений рак шлунка (РШ) характеризується несприятливим прогнозом, отже, навіть після радикальних хірургічних втручань більшість хворих гинуть внаслідок прогресування захворювання протягом перших двох років [1]. Превалюючим типом прогресування РШ є імплантаційне метастазування з розвитком карциноматозу очеревини (КО) [2], що ймовірно відбувається через наявність мікроскопічного пулу злоякісних клітин по очеревині на момент хірургічного втручання [3] чи перитонеальної дисемінації процесу інтраопераційно [4].

Згідно з сучасними літературними даними КО розвивається у 38–60% хворих після радикального хірургічного лікування РШ [5, 6]. Визначальними факторами ризику розвитку КО у таких хворих є: інвазія серозної оболонки шлунка пухлиною [7], наявність пухлинних клітин у змивах з очеревини [8], великий розмір пухлини з широким ураженням серозної оболонки [9], інфільтративний тип росту пухлини [10], гістологічні варіанти РШ, схильні до імплантаційного метастазування [11], а також метастатичне ураження регіонарних лімфатичних вузлів [12].

Інвазія серозної оболонки шлунка, без сумніву, є визначальним фактором метакронного імплантаційного метастазування, що визначає можливість дисемінації пухлинних клітин по черевній порожнині

та швидкий фатальний прогноз. Так, метакронний КО розвивається після радикальної операції у 50% пацієнтів з пухлинною інвазією серозної оболонки шлунка [13]. Ризик інтраперитонеального рецидиву зростає зі збільшенням площі ураження «серози» шлунка — при тотальному циркулярному ураженні шлунка КО розвивається у 64,9% хворих [14].

Медіана виживаності хворих на РШ з позитивними змивами з очеревини становить 19 міс, тоді як у хворих з негативними змивами — 38 міс [15]. В редакції 7 перегляду TNM-класифікації (UICC) 2009 року, в рубрику РШ вперше за багато років введено категорію перитонеальних змивів, позитивний характер котрих відтепер розцінюють як ознаку віддаленого метастазування [16].

Інтраперитонеальний рецидив найчастіше розвивається при персеподібноклітинному (65%), недиференційованому та низькодиференційованому (52–54%) раках, тоді як високо- та помірnodиференційована аденокарцинома рідко передує КО (17,3–27%) [17].

Враховуючи появу нових активних способів лікування регіонарної внутрішньочеревної ад'ювантної хімотерапії хворих на місцево-поширений РШ [18], проблема вивчення факторів ризику інтраперитонеального прогресування РШ набуває сьогодні нових аспектів актуальності.

Метою нашого дослідження було вивчення віддалених результатів хірургічного

лікування хворих на РШ з високим ризиком інтраперитонеального прогресування, тобто, факторів ризику розвитку метастазів КО.

## ОБ'ЄКТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведено аналіз результатів хірургічного лікування 57 хворих на РШ з пухлинною інвазією серозної оболонки шлунка та відповідно високим ризиком інтраперитонеального прогресування після радикальних хірургічних втручань, що знаходилися на стаціонарному лікуванні у Львівському державному онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі у 2007–2010 рр. (проспективний аналіз). Чоловіки становили 61,4% (35 хворих), жінки — 38,6% (22 хворі). Вік хворих становив від 26 до 79 років, середній вік — 61,1 ± 9,5 року. У всіх хворих під час гістологічного дослідження макропрепарату після хірургічного втручання виявлено інвазію серозної оболонки шлунка («серозоінвазивні» пухлини шлунка — Т4а, Т4б). Хворі з позитивними змивами з очеревини чи маніфестованим на момент втручання КО в дослідження не включалися.

У хворих переважали низько- та недиференційовані аденокарциноми, які в сумі становили 57,9% випадків, помірnodиференційована аденокарцинома зустрічалася у 19,3%, високодиференційована — у 8,8%, персеподібноклітинна — у 12,3% та муцинозна — у 1,7% хворих.

Характеристика хворих в залежності від локалізації первинної пухлини шлунка відображена у табл. 1.

Характеристика 57 хворих на «серозоінвазивний» РШ в залежності від

макроскопового типу росту пухлини шлунка за класифікацією Borrmann відображена у табл. 2, у хворих переважали III та IV тип за Borrmann.

**Таблиця 2** Розподіл хворих відповідно до типу росту первинної пухлини за Borrmann

Тип росту пухлини шлунка	Кількість хворих, абс. (відн. %)
I тип	2 (3,5%)
II тип	14 (24,6%)
III тип	27 (47,3%)
IV тип	14 (24,6%)
Всього	57

Первинна пухлина шлунка у 53 (93%) пацієнтів була з інфільтрацією серозної оболонки (Т4а), та у 4 (7%) — з інвазією у сусідні органи (Т4б).

Розподіл 57 хворих на «серозоінвазивний» РШ залежно від площі пухлинної інфільтрації серозної оболонки шлунка був наступним: у 31 (54,4%) хворого площа ураження серозної оболонки була меншою 20 см<sup>2</sup>, у 17 (29,8%) — більшою 20 см<sup>2</sup> та у 9 (15,8%) спостерігали субтотальне та тотальне ураження серозної оболонки шлунка.

Структура обсягу хірургічних втручань у 57 хворих була наступною: 22 (38,6%) хворим виконано гастректомію, 31 (54,4%) — дистальну субтотальну резекцію шлунка, та 4 (7%) — гастректомію з резекцією нижньої третини стравоходу. Комбінований обсяг операцій виконано у 10 (17,5%) пацієнтів. D1 лімфаденектомію виконано 33 (58%) хворим на «серозоінвазивний» РШ та D2 — 24 (42%) пацієнтам.

Постадійний розподіл 57 хворих на РШ з інвазією «серози» згідно з TNM-

класифікацією (2009) представлено у табл. 3.

Системна ад'ювантна хіміотерапія у досліджуваних хворих не застосовувалася.

**Таблиця 3** Розподіл хворих згідно зі стадіями TNM (UICC, 2009)

Стадія	Кількість хворих абс. (відн. %)
IIIB T4aN0M0	28 (49,1%)
IIIA T4aN1M0	11 (19,3%)
IIIB T4aN2M0	14 (24,6%)
T4bN0–1M0	
IIIC T4aN3M0	4 (7%)
T4bN2–3M0	
Всього	57

Статистичну обробку первинних даних проводили з використанням програми Statistica. Таблиці частот та зв'язків аналізували за допомогою точного критерію Фішера, критерію  $\chi^2$  та  $\lambda$ -критерію Вілкоксона. Для дослідження кумулятивної виживаності хворих використовували цензурований метод Каплана—Мейера. Визначення вірогідності у різниці рівнів виживаності в окремих групах здійснено за допомогою логарифмічного рангового коефіцієнта.

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ


Середній час перебування 57 хворих на «серозоінвазивний» РШ у стаціонарі становив 24,9 ± 9,5 доби (від 16 до 79 діб) та залежав від характеру хірургічного лікування, наявності ускладнень.

Після проведення радикальних хірургічних втручань рівень післяопераційних ускладнень у досліджуваних хворих становив 5 (8,8%) випадків, серед яких зафіксовано неспроможність швів куки дванадцятипалої кишки, неспроможність швів езофагоєюноанастомозу, післяопераційний панкреатит, міжпеллеві абсцес та госпітальну пневмонію у кожного окремого хворого відповідно. Випадків післяопераційної летальності не зафіксовано.


Після проведеного хірургічного лікування усі хворі знаходилися на диспансерному спостереженні, що передбачало

**Таблиця 1** Розподіл хворих в залежності від локалізації первинної пухлини

Локалізація первинної пухлини	Кількість хворих абс. (відн. %)
Проксимальний відділ (у тому числі з інвазією стравоходу)	3 (5,3%)
Карцинома куки шлунка з поширенням на нижню третину стравоходу	1 (1,7%)
Тіло	12 (21,1%)
Тіло + антральний відділ	5 (8,8%)
Антральний відділ	27 (47,4%)
Субтотальне та тотальне ураження	9 (15,7%)
Всього	57



**Рис. 1.** Кумулятивна цензурована загальна та безрецидивна виживаність 57 хворих на «серозоінвазивний» РШ



**Рис. 2.** Кумулятивна цензурована виживаність хворих на «серозоінвазивний» РШ залежно від площі пухлинної інфільтрації серозної оболонки

проведення клініко-інструментальних обстежень під час диспансерних візитів кожні 3–4 міс. За період спостереження з 2007 по 2011 роки прогресування пухлинного процесу після проведеного хірургічного лікування стало причиною смерті 33 (57,9%) із 57 хворих. 1-, 2- та 3-річна виживаність хворих становила 71,9; 47,4 та 43,9% відповідно. Медіана загальної тривалості життя (MeЗТЖ) та медіана безрецидивної тривалості життя (MeБТЖ) хворих становила 19 та 15 міс відповідно (рис. 1).

Найчастішим шляхом метастазування при прогресуванні «серозоінвазивного» РШ була дисемінація по очеревині в самостійному вигляді чи в комбінації з метастазами іншого характеру. Характеристика досліджуваних хворих залежно від шляхів прогресування РШ відображена у табл. 4.

Інтраперитонеальний рецидив (метакронний КО) після хірургічного лікування діагностовано у 27 (47,4%) хворих, що становить 81,8% серед 33 хворих з прогресуванням «серозоінвазивного» РШ. MeЗТЖ та MeБТЖ після хірургічного лікування у 27 хворих з інтраперитонеальним рецидивом становила 12,6 та 9 міс відповідно.

У результаті монофакторного аналізу встановлено чинники, що вірогідно корелюють з виживаністю хворих на РШ з інвазією серозної оболонки: тип росту пухлини за Vogtmann, площа пухлинної інфільтрації серозної оболонки шлунка (рис. 2), інвазія пухлини в сусідні органи (Т4b), комбінований обсяг хірургічного втручання, статус регіонарних лімфатичних вузлів та стадія процесу.

Шляхом дискримінантного аналізу встановлено, що достовірний вплив на розвиток метакронного КО у хворих на «серозоінвазивний» РШ мають наступні предиктивні фактори: локалізація пухлини, тип росту пухлини за Vogtmann,

гістологічна форма пухлини та площа ураження серозної оболонки шлунка пухлиною (табл. 5).

Інтраперитонеальний рецидив після хірургічного лікування хворих на РШ з інвазією серозної оболонки найчастіше розвивався при локалізації пухлини в тілі шлунка та тотальному ураженні шлунка — у 50 та 88,9% випадків відповідно, тоді як при локалізації пухлини в антральному відділі — у 29,6% хворих.

Високим ризиком інтраперитонеального прогресування характеризувалися хворі з пухлинами III та IV типу за Vogtmann, тоді як при I та II типі такий ризик був мінімальним.

При низькодиференційованій, недиференційованій та перснеподібноклітинній карциномі метакронний КО розвивався у 58,3; 66,7 та 71,4% хворих, при диференційованих пухлинах — у поодиноких хворих.

Площа інфільтрації пухлиною серозної оболонки шлунка прямо пропорційно корелювала з інтраперитонеальним рецидивом, рівень котрого зростає з 25,8% при площі ураження меншій 20 см<sup>2</sup> до 88,9% при субтотальному та тотальному ураженні серозної оболонки.

Отже, високим ризиком інтраперитонеального прогресування характеризувалися інфільтративного типу росту малодиференційовані та перснеподібноклітинні карциноми з локалізацією в тілі шлунка чи субтотальним ураженням серозної оболонки шлунка — метакронний КО розвивався у 88,9% таких хворих.

Таким чином, «серозоінвазивний» РШ у значній кількості хворих на момент діагностики супроводжується субклінічною перитонеальною дисемінацією, про що свідчить маніфестація КО вже протягом перших місяців чи років після лікування. Очевидно, що такі хворі потребують комбінованих методів лікування. Два

метааналізи рандомізованих досліджень попередніх років не продемонстрували зростання виживаності при застосуванні системної ад'ювантної хіміотерапії у хворих на резектабельний РШ [19, 20].

У 2004 р. Кохрейнівським співтовариством проведено метааналіз рандомізованих досліджень ефективності застосування ад'ювантної внутрішньочеревної хіміотерапії у радикально оперованих хворих на місцево-поширений РШ, котрий засвідчив статистично вірогідну перевагу комбінованого лікування порівняно із групою хірургічного контролю. Найвищі результати загальної та безрецидивної виживаності отримано при проведенні внутрішньочеревної хіміотерапії в гіпертермічному режимі [21]. Отже, актуальність проблеми стратифікації групи хворих на РШ з високим ризиком інтраперитонеального прогресування сьогодні не викликає сумніву.

Отримані нами результати щодо таких достовірних факторів погнозу метакронного КО, як тип росту пухлини за Vogtmann, гістологічна форма та локалізація пухлини є співзвучними з опублікованими результатами деяких інших авторів [22]. За результатами даного дослідження, до предиктивних факторів інтраперитонеального прогресування РШ можна віднести також такий об'єктивний та зручний для використання критерій як площа інфільтрації пухлиною серозної оболонки шлунка.

**ВИСНОВКИ**

РШ з інвазією серозної оболонки характеризується несприятливим прогнозом: MeЗТЖ таких хворих становить 19 міс, MeБТЖ — 15 міс.

Найчастішим шляхом метакронного метастазування «серозоінвазивного» РШ є перитонеальна дисемінація, котру діагностовано у 47,4% хворих та у 81,8% хворих з прогресуванням захворювання.

Достовірним впливом на розвиток метакронного КО у хворих на «серозоінвазивний» РШ характеризуються наступні предиктивні фактори: локалізація пухлини, тип росту пухлини за Vogtmann, гістологічна форма пухлини та площа ураження серозної оболонки шлунка пухлиною.

Малодиференційовані та перснеподібноклітинні аденокарциноми інфільтративного типу росту з субтотальним характером інфільтрації серозної оболонки шлунка у 88,9% випадків супроводжуються метакронним КО, тому характеризуються субклінічною перитонеальною дисемінацією на момент хірургічного втручання та очевидно потребують комбінованих підходів до лікування.

**ЛІТЕРАТУРА**

1. Lim L., Michael M., Mann G.B. et al. (2005) Adjuvant therapy in gastric cancer. J. Clin. Oncol., 23: 6220–6232.
2. Yoo C.H., Noh S.H., Shin D.W. et al. (2000) Recurrence following curative resection for gastric carcinoma. Br. J. Surg., 87: 236–242.
3. Koga S., Kaibara N., Itsuka Y. et al. (1984) Prognostic significance of intraperitoneal free cancer cells

**Таблиця 4** Структура випадків прогресування «серозоінвазивного» РШ після хірургічного лікування

Локалізація метастазів	Кількість хворих абс. (відн. %)
Очеревина	13 (39,4%)
Очеревина + віддалені лімфатичні вузли	6 (18,2%)
Печінка + віддалені лімфатичні вузли	3 (9%)
Очеревина + печінка	2 (6,1%)
Очеревина + плевра	2 (6,1%)
Очеревина + рецидив в анастомозі	2 (6,1%)
Віддалені лімфатичні вузли	2 (6,1%)
Печінка	1 (3%)
Очеревина + віддалені лімфатичні вузли + печінка	1 (3%)
Очеревина + віддалені лімфатичні вузли + плевра	1 (3%)
Всього	33

**Таблиця 5** Прогностичні фактори інтраперитонеального рецидиву у хворих на «серозоінвазивний» РШ після хірургічного лікування

Фактор прогнозу	Лямбда	Вілкоксона, λ	p
Вік	0,907		0,061
Стать	0,999		0,822
Локалізація пухлини	0,832		0,002
Тип росту пухлини за Vogtmann	0,807		0,001
Гістологічна форма пухлини	0,837		0,002
Площа ураження серозної оболонки шлунка	0,757		0
Комбінована операція	0,986		0,387
Лімфодисекція (D1/D2)	0,991		0,471
Кількість видалених регіонарних лімфатичних вузлів	0,987		0,4
Кількість метастатично уражених регіонарних лімфатичних вузлів	0,983		0,337

in gastric cancer patients. *J. Cancer Res. Clin. Oncol.*, 108: 236–238.

4. Zoetmulder F. Cancer cell seeding during abdominal surgery: experimental studies. In: Sugarbaker P.H.: *Peritoneal carcinomatosis: principles of management*. Boston, USA. Kluwer Academic publishers, 155–161.

5. Garofalo A., Ferramondo F. (2009) Radical resection and intraoperative hyperthermic chemoperfusion in gastric carcinoma patients at high risk of peritoneal recurrence. Randomized multicentric phase III study. The 8<sup>th</sup> international gastric cancer congress (IGCC): abstract book. — Krakow, Poland: 98–99.

6. Cunningham D., Allum W.H., Stenning S.P. et al. (2006) Perioperative chemotherapy versus surgery alone for resectable gastro-esophageal cancer. *N. Engl. J. Med.*, 355: 11–20.

7. Wu C.W., Lo Wu S.S., Shen K.H. et al. (2003) Incidence and factors associated with recurrence patterns after intended curative surgery for gastric cancer. *World J. Surg.*, 27: 153–158.

8. Bentrem D., Wilton A., Mazumdar M. et al. (2005) The value of peritoneal cytology as a preoperative predictor in patients with gastric carcinoma undergoing a curative resection. *Ann. Surg. Oncol.*, 12: 347–353.

9. Неред С.Н., Клименков А.А. (2005) Хирургическое лечение рака желудка с высоким риском имплантационного метастазирования. *Вопр. Онкол.*, 51 (1): 75–80.

10. Maehara Y., Hasuda S., Koga T. et al. (2000) Postoperative outcome and sites of recurrence in patients following curative resection of gastric cancer. *Br. J. Surg.*, 87: 353–357.

11. Marrelli D., Roviello F., de Manzoni G. et al. (2002) Different patterns of recurrence in gastric cancer depending on Lauren's histological type: longitudinal study. *World J. Surg.*, 26: 1160–1165.

12. Roviello F., Marrelli D., de Manzoni G. et al. (2003) Prospective study of peritoneal recurrence after curative surgery for gastric cancer. *Br. J. Surg.*, 90: 1113–1119.

13. Moriguchi S., Maehara Y., Korenaga D. et al. (1992) Risk factors which predict pattern of recurrence after curative surgery for patients with advanced gastric cancer. *Surg. Oncol.*, 1: 341–346.

14. Неред С.Н. (2004) Хирургическое и комбинированное лечение рака желудка с высоким риском имплантационного метастазирования и рака резецированного желудка: автореф. дис. ... доктора мед. наук: Москва. 21 с.

15. La Torre M., Ferri M., Giovannoli M.R. et al. (2010) Peritoneal wash cytology in gastric carcinoma. Prognostic significance and therapeutic consequences. *Eur. J. Surg. Oncol.*, 36: 982–986.

16. TNM: Классификация злокачественных опухолей (2011) Собина Л.Х. и др. (ред.); пер. с англ. и научн. ред. А.И. Щеголев, Е.А. Дубова, К.А. Пав-

лов. — М.: Логосфера, 304 с. — Перевод изд. TNM Classification of Malignant Tumors, 7<sup>th</sup> ed. — ISBN 978-5-98657-025-9.

17. Скоропад В.Ю., Бердов Б.А. (2008) Закономерности развития рецидивов и метастазов у больных местнораспространенным раком желудка. XII Российский онкологический конгресс: материалы конгресса, Москва: 94–96.

18. Yonemura Y., de Aretxabala X., Fujimura T. et al. (2001) Intraoperative chemohyperthermic peritoneal perfusion as an adjuvant to gastric cancer: final results of a randomized controlled study. *Hepatogastroenterology*, 48: 1776–1782.

19. Hermans J., Bonenkamp J.J., Boon M.C. et al. (1993) Adjuvant therapy after curative resection for gastric cancer: meta-analysis of randomized trials. *J. Clin. Oncol.*, 11: 1441–1447.

20. Janunger K.G., Hafstrom L., Glimelius B. et al. (2002) Chemotherapy in gastric cancer: a review and updated meta-analysis. *Eur. J. Surg.*, 168: 597–608.

21. Xu D.Z., Zhan Y.Q., Sun X.W. et al. (2004) Meta-analysis of intraperitoneal chemotherapy for gastric cancer. *World J. Gastroenterol.*, 10: 2727–2730.

22. Скоропад В.Ю., Бердов Б.А. (2009) Влияние морфологического строения рака желудка на закономерности развития рецидивов и метастазов. *Вопр. Онкол.*, 55(1): 60–65.

## Рак желудка с высоким риском интраперитонеального прогрессирования: факторы риска и результаты хирургического лечения

P.P. Yarema, M.T. Fetysch

Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого, Львов

**Резюме.** Проанализированы отдаленные результаты хирургического лечения 57 больных раком желудка с инфильтрацией серозной оболочки. Установлен неблагоприятный прогноз для пациентов данной категории — медиана общей и безрецидивной выживаемости составили 19 и 15 мес соответственно. Установлено, что наиболее частым путем метастазирования «серозоинвазивного» рака желудка была имплантационная диссеминация, которую диагностировано у 47,4% больных и у 81,8% больных с прогрессированием заболевания. Локализация опухоли, тип роста опухоли по Vogtmann, гистологическая форма опухоли и площадь поражения серозной оболочки желудка опухолевым процессом определены как достоверные предиктивные факторы метастазирования карциноматоза брюшины у больных с «серозоинвазивным» раком желудка.

**Ключевые слова:** рак желудка, инвазия серозной оболочки, метастазирование карциноматоза брюшины, факторы риска.

## Gastric cancer with a high risk of intraperitoneal progression: risk factors and results of surgical treatment

R.R. Yarema, M.T. Fetysch

Lviv national medical university, Lviv

**Summary.** Analised remote results of surgical treatment 57 patients with gastric cancer with infiltration serosal shell. Found poor forecast for patients this category — median overall and disease free survival was 19 and 15 month respectively. It is established that the most frequent way disease progression of «serosainvasive» gastric cancer was peritoneal dissemination, which found in 47.4% patients, and in 81.8% patients with disease progression. Tumor localization, a type of tumor growth by Borrmann, histological form and area infiltrating serosal shell by tumor defined as significantly factors of metachronous peritoneal carcinomatosis in patients with «serosainvasive» gastric cancer.

**Key words:** gastric cancer, infiltrating of serosal shell, metachronous peritoneal dissemination, risk factors.