




Доведена ефективність при гепатоцелюлярній карциномі (ГЦК) та нирково-клітинній карциномі (НКК), що важко піддаються лікуванню^{1,2}



Нексавар - схвалений для лікування

- Пацієнтів з гепатоцелюлярною карциномою
- Пацієнтів з поширеною нирково-клітинною карциномою



Загальна характеристика: міжнародна назва: сорафеніб; круглі таблетки червоного кольору, з одного боку таблетки витиснене маркування у вигляді «байєрівського хреста», з іншого боку – цифра 200.

Склад: 1 таблетка містить сорафенібу тозилату 274 мг у перерахунку на сорафеніб 200 мг, допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, гіпромелоза, магнію стеарат, натрію лаурилсульфат, макрогол 3350, титану діоксид (E 171), заліза оксид червоний (E 172).

Форма випуску. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

Фармакотерапевтична група. Протипухлинний препарат, інгібітор протеїнази. Код АТХ: L01X E05.

Показання для застосування.

Розповсюджений нирково-клітинний рак. Гепатоцелюлярна карцинома.

Спосіб застосування та дози.

Рекомендована добова доза сорафенібу становить 800 мг (4 таблетки по 200 мг). Добова доза призначається в два прийоми (по 2 таблетки двічі на добу), в проміжках між вживанням їжі чи разом з нежирною їжею. Таблетки запивають склянкою води. Лікування продовжують доти, доки відзначається клінічна ефективність препарату або до появи неприйнятної токсичної дії. У разі виникнення очікуваних небажаних реакцій може бути необхідним тимчасове припинення застосування і/або зменшення дози сорафенібу. У разі необхідності дозу сорафенібу можна знизити до 400 мг один раз на добу.

Побічна дія.

До найбільш поширених побічних реакцій при застосуванні препарату належали діарея, висипання, алопеція та долонно-підшовна еритродизестезія (долонно-підшовний шкірний синдром). Побічні

реакції, які були зареєстровані принаймні у 5 % пацієнтів у кожній групі лікування (дослідження 11213) при нирково-клітинному раку: анорексія, головний біль, гіпертензія, припливи, діарея, нудота, блювання, закрел, висипання, долонно-підшовна еритродизестезія, свербіж, еритема, сухість шкіри, лущення шкіри, артралгія, біль у кінцівках, втомлюваність, астенія.

Протипоказання.

Гіперчутливість до сорафенібу або до будь-якої з допоміжних речовин препарату.

Упаковка.

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 200 мг. По 28 таблеток в блістері. По 4 блістери разом з інструкцією в картонній паці.

Виробник. Байєр Хелскер АГ.

Адреса. Д-51368 Леверкузен, Німеччина.

References. 1. Jovet J, et al. Presentation at ASCO Ann Meet 2007, Chicago, IL. (Abstr LBA1) www.asco.org. Accessed April 15, 2008. 2. Bukowski RM, et al. Presentation at ASCO Ann Meet 2007, Chicago, IL. (Abstr 5023)

www.asco.org. Accessed April 15, 2008.

Повна інформація про препарат міститься в інструкції для медичного застосування.

За більш детальною інформацією про препарат просимо звертатися до підрозділу Bayer Schering Pharma ТОВ «Байєр» за адресою:

вул. Верхній Вал, 4-Б, 3 поверх, 04071, м. Київ, тел.: (044) 220-33-00; www.bayer.ua