

ЕПОБІОКРИН®

рекомбінантний епоетин альфа

по 1000, 2000, 4000, 10 000 МО



Р. п. № 353/13-300200000 від 22.02.2013.

Якісний і кількісний склад. Діючі речовини: рекомбінантний еритропоетин людини 1000 або 2000, або 4000, або 10 000 МО; допоміжні речовини: альбумін у перерахунку на сухий альбумін (стабілізатор) — 2,50 мг, натрію цитрат — 5,80 мг, натрію хлорид — 5,84 мг, кислота лимонна — 0,057 мг, вода для ін'єкцій — 1 мл. **Показання до застосування.** Анемія у хворих з уремічною стадією хронічної ниркової недостатності (ХНН). Анемія, викликана дефіцитом еритропоетину у хворих на ХНН; анемії, пов'язані з хіміо- та радіотерапією пухлин; анемії у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, викликані застосуванням зидовудину; ЕПО-залежні анемії (немієлоїдні пухлини, ревматоїдний артрит та ін.); для зменшення об'єму крові, що переливається, при великих хірургічних втручаннях і гострих крововтратах. **Протипоказання.** Неконтрольована артеріальна гіпертензія, підвищена чутливість до епоетину альфа. Застосування препарату протипоказано: перед проведенням великої хірургічної операції не в рамках переддепозитної програми, з використанням аутологічної крові; при тяжкій патології судин (у тому числі коронарних, сонних, церебральних, периферичних), при нещодавно перенесеному інфаркті міокарда, гострому порушенні мозкового кровообігу.

Інформація про лікарський засіб для професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників.
Перед використанням обов'язково ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування препарату.