

Медітан

Gabapentin

СВОБОДА ВІД БОЛЮ



**ЕФЕКТИВНИЙ У ЛІКУВАННІ
НЕВРОПАТИЧНОГО БОЛЮ***

**ВИСОКИЙ ПРОФІЛЬ
БЕЗПЕКИ****

Медітан капсули 300 мг № 30, 400 мг № 30

Діюча речовина: габапентин

Спосіб застосування: ефективна доза препарату становить 900–3600 мг/добу (розділена на 3 прийоми) для дорослих

* Backonja M., Serra J. Pharmacologic management part 1: better-studied neuropathic pain diseases. Pain Med., 2004, 5 (Suppl. 1), S28–S47.

** Bennet M. (ed). Neuropathic pain. Oxford University Press, 2006. 176 p.

МЕДІТАН. Склад. 1 капсула містить габапентину у перерахуванні на безводну речовину 300 мг або 400 мг. **Фармакотерапевтична група.** Протиепілептичні засоби. Габапентин. **Код АТС.** N03A X12. **Показання.** Лікування парціальних епілептичних нападів з або без вторинної генералізації у дорослих та дітей віком від 6 років у комбінації з іншими протиепілептичними препаратами. Лікування парціальних епілептичних нападів з або без вторинної генералізації у дорослих та дітей віком від 12 років — як монотерапія. Лікування супутнього неврологічного болю у дорослих при діабетичній нейропатії та постгерпетичній невралгії. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до компонентів препарату. **Побічні ефекти.** Вірусні інфекції, пневмонія, респіраторні інфекції, інфекції сечової системи, отит середнього вуха; лейкопенія, тромбоцитопенія; алергічні реакції; анорексія, підвищення апетиту, збільшення маси тіла, коливання рівня глюкози у крові пацієнтів із цукровим діабетом; занепокоєння, емоційна лабільність, депресія, порушення мислення, збудження, галюцинації; сонливість, запаморочення, атаксія, судоми, гіперкінезія, дизартрія, амнезія, тремор, безсоння, головний біль, парестезія, гіпостезія, порушення координації, ністагм, посилення, послаблення або відсутність рефлексів, гіпокінезія, хореоатетоз, дискінезія, дистонія; порушення зору, амбліопія, диплопія; відчуття серцебиття, артеріальна гіпертензія, вазодилатація та ін. **Категорія відпуску.** За рецептом. Повна інформація про лікарський засіб міститься в інструкції для медичного застосування.

Р.п. МОЗ України № UA/12318/01/02, UA/12318/03 від 22.06.2012 по 22.06.2017

Інформація для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження на конференціях, семінарах, симпозіумах з медичної тематики. Матеріал призначений виключно для спеціалістів охорони здоров'я. Перед використанням препарату обов'язково ознайомтеся з повною інструкцією для застосування.

Фармак

Україна, 04080,
м. Київ, вул. Фрунзе, 63.
Тел.: (044) 531 9676, 239 1944
www.farmak.ua