



ФІЛСТИМ®

Філграстим у шприцах

філграстим – 0,3 мг (30 млн МО) або 0,48 мг (48 млн МО) в 1 мл

Корекція нейтропенії на фоні основної терапії

- ✓ В онкологічних пацієнтів після ХТ та РТ*
- ✓ У пацієнтів із хронічним гепатитом С*

✓ У пацієнтів із хронічним гепатитом С*

Коротка інформація щодо безпеки препарату Філстим®

Побічна дія. Шлях усвоєння і мікроклімат. Шлях усвоєння: зникнення АТ. Сучасний препарат. Описані різні випадки розвитку реакцій алергічного типу.

Протипоказання. Пригнічення чутливості до препарату. Тяжка вроджена непереносливість (сіндром Костмана) з цитогенетичними порушеннями. Перед призначенням препарату Філіпс, будь ласка, ознайомтеся з повною інструкцією для його застосування.*

Посилання: "Інструкція для медичного застосування препарату Філіпс".
Цей матеріал призначено тільки для спеціалістів у галузі охорони здоров'я та лише для поширення і демонстрації під час спеціалізованих заходів. У разі виниклих питань, пов'язаних із препаратами «БІОФАРМ», звертайтеся:

Посилання: *Інструкція для медичного застосування препарату Філістим*

Цей матеріал призначено тільки для спеціалістів у галузі охорони здоров'я та лише для поширення і демонстрації під час спеціалізованих заходів.
У разі виникнення питань, пов'язаних із препаратами «БІОФАРМ», звертайтеся:

ТОВ «Фармацевтичний завод БІОФАРМА»

Бізнес-центр «Горизонт Парк»
03038, Україна, Київ, вул. Амосова, 4-й поверх
Тел.: +38 (044) 277-36-10
Факс: +38 (044) 275-80-24
<http://www.biofarma.ua/>