

Зелбораф

вемурафениб


Зелбораф — первый* зарегистрированный препарат для персонализированной монотерапии неоперабельной или метастатической меланомы кожи, в клетках которой выявлена мутация BRAF V600^{1,2}

Зелбораф:

Увеличение ОВ — до 13,6 мес.
Увеличение ВПБ — до 6,9 мес.

по сравнению с дакарбазином у пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой, не получавших лечение ранее³

Единственный* таблетированный препарат для таргетной терапии меланомы кожи²



ЗЕЛБОРАФ: информация о препарате

Действующее вещество: vemurafenib. **Лекарственная форма и состав:** таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 1 таблетка содержит вемурафениба 240 мг. **Показания.** Монотерапия неоперабельной или метастатической меланомы, в клетках которой выявлено мутацию BRAF V600. **Противопоказания.** Повышенная чувствительность к вемурафенибу и другим компонентам препарата. **Способ применения и дозы.** Перед началом приема препарата Зелбораф необходимо подтвердить наличие мутации BRAF V600 в клетках опухоли. Рекомендованная доза вемурафениба составляет 960 мг (4 таблетки по 240 мг) дважды в сутки; суточная доза — 1920 мг. Можно принимать вместе с едой или без еды. Таблетки глотать целиком, не разжевывая, не разламывая, запивая стаканом воды. Терапию рекомендуется продолжать до начала прогрессирования заболевания или появления недопустимых признаков токсичности. **Побочные реакции.** Наиболее частыми побочными реакциями являются артралгия, слабость, сыпь, реакция фоточувствительности, тошнота, алопеция и зуд. Очень часто сообщалось о плоскоклеточной карциноме кожи, лечение которой было, как правило, хирургическим. Фармакологические свойства. Вемурафениб — низкомолекулярный пероральный ингибитор фермента серин-треонинкиназы, который кодируется геном BRAF.

Мутации в гене BRAF приводят к конститутивной активации белка BRAF, что может способствовать пролиферации клеток в отсутствие факторов роста, которые в норме необходимы для пролиферации. Вемурафен ингибирует BRAF-киназы с активационным кодом 600 мутаций. 94% материала, связанного с вемурафенибом, выводятся с фекалиями и 1% — с мочой. **Сроки годности.** 2 года. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить при температуре не выше 30 °C в оригинальной упаковке в защищенном от влаги месте. **Категория отпуска** — по рецепту.

Информация представлена в сокращенном виде. Более детальная информация относительно препарата Зелбораф содержится в инструкции для медицинского использования (утверждена приказом МЗ Украины от 29.03.2013 №254. Регистрационное свидетельство №UA/12699/01/01. Дата последнего пересмотра: 19.12.2014.

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией для медицинского применения препарата. Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников. Для размещения в специализированных изданиях, предназначенных для медицинских учреждений и врачей.

ОВ — общая выживаемость. ВПБ — выживаемость без прогрессирования.

* Зарегистрированный в Украине.

ООО «Рош Украина»:

Киев, 04070, ул. П. Сагайдачного, 33.

Тел.: +380 (44) 354 30 40, факс: +380 (44) 354 30 41.

www.roche.ua

