



Для імуносупрессивних пацієнтів вибір противогрибкового препарату дуже важливий

## Допоможіть пацієнтам у боротьбі за їхні життя

МСД допомагає у боротьбі з інфекційними захворюваннями

**НОКСАФІЛ®**  
ПОСАКОНАЗОЛ

**Кансидаz®**  
каспофунгін

Коротка інформація по препаратам Кансидаz® та Ноксафіл®

Кансидаz® (каспофунгін) – протигрибковий засіб для системного застосування. 1 флакон містить каспофунгіну ацетату 60,6 мг або 83,9 мг, що еквівалентно безводній основі 50 мг або 70 мг відповідно<sup>1</sup>. **Показання:** Лікування інвазивного кандидозу, інвазивного аспергільозу в дорослих та дітей при рефрактерності або непереносимості до амфотерицину В, ліпідних форм амфотерицину В та/або ітраконазолу. Емпірична терапія при підо年之і на грибкові інфекції (*Candida* або *Aspergillus*) у дорослих та дітей з фебрільною нейтропенією<sup>1</sup>. Для дітей віком від 12 місяців до 17 років) дозування залежить від площи поверхні тіла пацієнта. **Протипоказання:** Підвищена чутливість до дюючої речовини або до будь-якої допоміжної речовини препарату<sup>1</sup>. **Виробник:** Лабораторії Мерк Шарп і Даум Шібрє, Франція, Мерк Шарп і Даум Б.В., Нідерланди\*

Ноксафіл® (посаконазол) – протигрибковий засіб для системного застосування. Похідні триазолу. Суспензія оральна. 1 мл суспензії містить посаконазолу (мікронізованого) 40 мг<sup>2</sup>. **Показання:** Ноксафіл® призначають для профілактики інвазивних грибкових інфекцій, спричинених дріжджовими або пліснявими грибами, у дорослих і дітей віком від 13 років, які мають підвищений ризик розвитку таких інфекцій (наприклад у пацієнтів з тривалою нейтропенією або реципієнти транспланtatів кровотворних стовбурових клітин). **Протипоказання:** Підвищена чутливість до посаконазолу або будь-якого іншого компонента препарату. Одночасне застосування з: субстратами СУРЗА4; алкалоїдами ріжків; інгібіторами ГМГ-КоА-редуктази, симвастатином, ловастатином та аторвастатином<sup>2</sup>. **Виробник:** Шерінг-Плау, Франція, Шерінг-Плау Лабо Н.В., Бельгія\*

Джерела: 1. Інструкція для медичного призначення Кансидаz®, 2. Інструкція для медичного призначення Ноксафіл®

\*Повна інформація про виробників знаходиться в інструкціях препаратів Кансидаzu і Ноксафілу.

Перед призначенням Кансидаz®, Ноксафіла®, будь-ласка, ознайомтеся з повними інструкціями по застосуванню препаратів. МСД не рекомендує призначати препарати у цілях, які відрізняються від тих, що прописані в інструкції по застосуванню даних препаратів. Даний матеріал призначений для спеціалістів охорони здоров'я і для розповсюдження на спеціалізованих медичних заходах та для публікації в спеціалізованих медичних журналах (виданнях)

AINF-1158260-0000

Матеріал виготовлений: серпень 2015. Матеріал придатний до: серпня 2017.

ТОВ «МСД Україна», адреса: 03038, м.Київ, БЦ «Горизонт Парк», вул.М.Амосова, 12, 3 поверх, тел.: +38 (044) 393-74-80, факс: +38 (044) 3937481

Якщо у вас з'явились питання по препаратам компанії МСД, пишіть нам за адресою: medinfo@merck.com, або звертайтесь на www.medical-msd.com. Авторські права © 2015 ТОВ «МСД Україна».

Всі права захищені.

