

КІТРУДА®

НОВІ ПОКАЗИ – БІЛЬШЕ ТЕРАПЕВТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ



I лінія – монотерапія метастатичного НДРЛ**, з експресією PD-L1 $\geq 50\%$, при відсутності мутацій EGFR та/або ALK®

I лінія – в комбінації з пеметрекседом і карбоплатином для лікування метастатичного неплоскоклітинного НДРЛ® **NEW**

II лінія – монотерапія метастатичного НДРЛ, з експресією PD-L1 $\geq 1\%$, після попереднього лікування хімотерапією та/або таргетною терапією при позитивних мутаціях EGFR, ALK®



I лінія – монотерапія нерезектабельної або метастатичної меланоми®



Монотерапія дорослих і дітей зі стійкою до лікування класичною лімфою Ходжкіна або при виникненні рецидиву після 3 або більше ліній терапії® **NEW**



Монотерапія рецидивуючого чи метастатичного плоскоклітинного раку голови та ший, що прогресує при проведенні чи після проведення хімотерапії з препаратами платини® **NEW**



Монотерапія місцево прогресуючої або метастатичної уротеліальної карциноми, якщо не показана хімотерапія з цисплатином® **NEW**

Монотерапія місцево прогресуючої або метастатичної уротеліальної карциноми, після прогресії при проведенні чи після завершення хімотерапії з цисплатином, або протягом 12 місяців неад'ювантної чи ад'ювантної хімотерапії з препаратом платини® **NEW**

* – зареєстрована торгова марка MERCK & CO., Inc., Kenilworth, N.J., U.S.A.

** НДРЛ – недрібноклітинний рак легень

Посилання: 1. Robert C., Schachter J., Long G.V. та інші дослідники для KEYNOTE-006. Пембролізумаб в порівнянні з іпілімумабом у пацієнтів з меланою. N Eng J Med. 2015; 372 (26): 2521–2532. 2. Herbst R.S., Baas P., Kim D.-W. та інші. Пембролізумаб в порівнянні з доцетакселом для раніше лікованих, PD-L1-позитивних пацієнтів з метастатичним або локально прогресуючим недрібноклітинним раком легень (KEYNOTE-010). Lancet. 2016; 387 (10027): 1540–1550. 3. Reck M., Rodriguez-Abreu D., Robinson A.G. та інші. Пембролізумаб в порівнянні з хімотерапією у пацієнтів з PD-L1-позитивним недрібноклітинним раком легень (KEYNOTE-024). N Eng J Med 2016; 375 (19): 1823–1833. 4. Gandhi L. та ін. дослідники для KEYNOTE-189. Пембролізумаб в поєднанні з хімотерапією для пацієнтів з метастатичним НДРЛ. N Eng J Med. April 16, 2018. 5. Bellmunt J. та ін. дослідники для KEYNOTE-045. Пембролізумаб в якості другої лінії терапії уротеліальної карциноми. N Eng J Med. February 17, 2017. 6. Laura Q.M. та ін. дослідники для KEYNOTE-012. Протипухлинна активність пембролізумабу для нерезектабельних пацієнтів з рецидивуючим чи метастатичним плоскоклітинним раком голови та ший без визначення біомаркерного статусу. J Clin Oncol, 2016. 7. Chen R. та ін. дослідники для KEYNOTE-087. Дані ефективності та безпеки використання пембролізумабу для пацієнтів зі стійкою до лікування та/або рецидивуючою класичною лімфою Ходжкіна. Clin Oncol 35: 2125–2132. 8. Інструкція для застосування препарату Кітруда®. Реєстраційне посвідчення № UA/16209/01/01, наказ МОЗ № 887 від 01.08.2017 року. ЗМІНИ ВНЕСЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 11.05.2018 № 907

Даний матеріал призначений для спеціалістів охорони здоров'я і для розповсюдження на спеціалізованих медичних заходах та для публікації в спеціалізованих медичних виданнях.

Матеріал виготовлений: травень 2018. Матеріал придатний до: травень 2019.

ONCO-1248001-0001



ТОВ «МСД Україна», адреса: 03038, м. Київ, БЦ «Горизонт Парк», вул. М. Амосова 12, 3-й поверх.
Тел.: +38 (044) 393-74-80, факс: +38 (044) 393-74-81.

Якщо у Вас з'явилися питання стосовно препаратів компанії МСД, пишіть нам на адресу:
medinfo@merck.com, або звертайтеся на <http://medical-msd.com>.

Авторські права © [2018] ТОВ «МСД Україна». Всі права захищені.