

НОВИЙ РІВЕНЬ РЕМІСІЇ

Комплексний терапевтичний підхід



Коротка інструкція для медичного застосування препарату МАБТЕРА

Міжнародна непатентована назва
Ритуксимаб

Показання

Неходжкінська лімфома

Рецидивуючі або стійкі до хіміотерапії В-клітинні, CD20-позитивні неходжкінські лімфоми низького ступеня злоякісності або фолікулярні. CD20-позитивні дифузні В-крупноклітинні неходжкінські лімфоми в комбінації з хіміотерапією за схемою СНОР. Раніше неліковані фолікулярні лімфоми III–IV стадії у комбінації з хіміотерапією. Підтримуюча терапія фолікулярних лімфом після отримання відповіді на індукційну терапію.

Хронічний лімфоплейкоз

Раніше нелікований і рецидивуючий/рефрактерний хронічний лімфоплейкоз у комбінації з хіміотерапією.

Спосіб застосування

Мабтеру вводять шляхом внутрішньовенної інфузії через окремий катетер. Перед кожною інфузією Мабтери необхідно проводити премедикацію.

Побічні ефекти

Інфузійні реакції. Організм в цілому: біль у поперековому відділі хребта, в грудній клітці, у місці інфузії, загальна слабкість, здуття живота. Серцево-судинна система: артеріальна гіпертензія, брадикардія, тахікардія, ортостатична гіпотонія, аритмія. Шлунково-кишковий тракт: діарея, диспепсія, анорексія. Лімфатична система: лімфаденопатія. Порушення обміну речовин і травлення: гіперглікемія, периферичні набряки, підвищення активності ЛДГ, гіпокальціємія. Кістково-м'язова система: болі в суглобах, м'язовий гіпертонус. Нервова система: тривога,

парестезії, гіперестезії, перезбудження, порушення сну, нервозність. Органи дихання: посилення кашлю, синусит, бронхіт, астма, ураження легенів. Система кровотворення: порушення згортання крові.

Протипоказання

Гіперчутливість до будь-якого компонента препарату або до білків миші.

Умови зберігання

При температурі 2–8 °С в захищеному від світла і недоступному для дітей місці.

Упаковка

Флакони по 100 мг/10 мл №2, по 500 мг/50 мл №1. Перед використанням препарату необхідно ознайомитися з повною інструкцією по застосуванню.

Перед використанням ознайомтесь з повною інструкцією про застосування.



ТОВ «Рош Україна», 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21; БЦ «Леонардо» 10-й поверх
Тел.: (044) 354-30-40; Факс: (044) 354-30-41, www.roche.ua
Сертифікат про держреєстрацію №400/10-300200000 від 27.04.10
UA.A.MAB.11.03.01

МаБТера
Ритуксимаб
КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР УСПІХУ