

АНОНСИ

Грибоподібний мікоз: сучасний стан проблеми в Україні

C. 231–235

Функціональні результати органозберігаючого лікування місцево-поширеного та метастатичного нирково-клітинного раку

C. 236–240

Онкологічні результати органозберігаючого лікування місцево-поширеного нирково-клітинного раку

C. 251–256

БОЗУЛІФ:

поєднання ефективності та безпеки при лікуванні ХМЛ^{1,2,3}

Доведена ефективність зі швидкою та тривалою відповіддю у 2-й лінії терапії ХМЛ¹:

- ВМВ на 24-й міс: 35%¹
 - Час до ВМВ у іматиніб-резистентних пацієнтів: 35,9 тиж
 - Час до ВМВ у пацієнтів з непереносимістю іматинібу: 12,2 тиж
- ПЦГВ на 24-й міс: 48%¹

Сприятливий профіль безпеки²

- Найбільш часте побічне явище — діарея¹
- Найбільш часте побічне явище ступеню 3/4 — тромбоцитопенія¹
- Можливе коригування дози для менеджменту побічних явищ

1. Bos... 2. Bos... 3. Bos... (Detailed clinical trial references and statistical data)



Сторінка авторизованого користувача... (Small text regarding user authentication and website information)

