



ІБРАНС
пабоциклів

ІБРАНС® в якості першої лінії терапії мРМЗ*:

Впевненість на основі даних про ЗВ

- ІБРАНС® в якості першої лінії терапії HR+/HER2- мРМЗ подовжує МЗВ до >50 місяців як у дослідженні PALOMA-2¹ (n=666), так і в дослідженні P-REALITY X¹, за даними когорти із реальної клінічної практики (n=2888)^{1,2}
 - Дані дослідження P-REALITY X¹ (n=2888) свідчать про те, що ІБРАНС® підвищує медіану виживаності на 14 місяців у разі комбінації з IA у пацієнтів з HR+/HER2- мРМЗ у першій лінії терапії²
 - МЗВ у випадку застосування ІБРАНС® у комбінації із IA досягла 57,8 місяця (95% ДІ 47,2-н/д) порівняно із 43,5 місяця (95% ДІ 37,6-48,9) для монотерапії IA^{6,2}

*HR+/HER2- MPM3

"БРАНС" плюс летрозол у дослідженні
PALOMA-2: жінки в період постменопаузи
HR+/HER2- MPM3.

ІІБРАНС® плюс IA в дослідженні РКП
P-REALITY X HR+/HER2- мРМЗ: 1% чоловіків
і 99% жінок у період постменопаузи.

6Після застосування методу псевдорандомізації.

Примітки: D1 – довірчий інтервал; HR+ – гормон-рецептор-позитивний; ЗВ – загальна виживаність; IA – інгібітор ароматази; мРМЗ – метастатичний рак молочної залози; н/д – не досягнуто; РКП – дані реальній клінічній практики; мЗВ – медiana загальної виживаності; HER2 – негативний за рецептором епідермального фактора росту людини 2.

1. Finn R.S. et al. J. Clin. Oncol., 2022, 40 (suppl. 17): LBA1003.
 2. Rugo H.S. et al. Ann. Oncol., 2022, 33 (suppl. 3): S202.

Тільки для медичних працівників

«Пфайзер Експорт Бі. ВІ.» в Україні:
03038, м. Київ, вул. М. Гринченка, 4В,
тел.: +38 (044) 391-60-50

З питань медичної інформації
звертайтеся на електронну адресу:
MedInfo.Ukraine@pfizer.com

За додатковою інформацією звертайтесь в Представництво «Профайл Эксперт Б.В.» в Україні, 03038, м. Київ, бул. М. Грушевського, 4-Б. Тел.: (044) 291-60-50. З питань медичної інформації звертайтесь на електронну адресу MedInfo.Ukraine@yandex.com