

- Довірно покращує виживаність^{1, 2}
- Стандарт 1-ї лінії лікування пацієнтів із мРПЗ згідно з настановами NCCN і ESMO (1A)^{3, 4}

1. Повну інформацію про показання, протипоказання, спосіб застосування та дози, окремі групи пацієнтів, особливості використання, побічні реакції тощо дивіться в інструкції для медичного застосування лікарського засобу ОНІВАРД® гелітальний ліпосомальний (p/n UA/1875/01/01, Наказ № 1768 від 20.08.2021, зміни внесені: 07.02.2025). 2. Мається на увазі, що у дослідженні NAPOLI-3 NALIRIFOX показав статистично достовірне покращення 38 та B5P порівняно із Gemt+Napb. Weinberg ZA et al. Lancet. 2023; 402 (10409): 1272-1281. 3. ESMO Clinical Practice Guideline Express Update on the management of metastatic pancreatic cancer. Conroy T et al. ESMO Open, Vol. 10, Issue 4, 104528. 4. NCCN Guidelines Pancreatic adenocarcinoma Ver. 2, 2025.

*Детальніша інформація викладена в інструкції для медичного застосування лікарського засобу **ОНІВАІД®** пегілюваний ліпосомальний Р/П/П **ОНІВ/18775/01/01**. Наказ № 1768 від 20.08.2021. Дата останнього перегляду: 18.08.2025. Інформація для професійної діяльності спеціалістів у галузі хімічної промисловості.