

При неудаче VEGF\*-таргетной терапии у пациентов с распространенным и/или метастатическим почечно-клеточным раком (мПКР)



## АФИНИТОР – доказанная эффективность и безопасность<sup>1-3</sup>

➤ Терапия АФИНИТОРОМ у пациентов с мПКР разных возрастных групп и всех групп прогноза по классификации MSKCC\*\*

- увеличивает медиану выживаемости без прогрессирования более чем в 2 раза
- достоверно снижает риск прогрессирования заболевания и/или смерти на 67%
- характеризуется хорошим профилем переносимости
- имеет простой и удобный режим приема (одна таблетка – один раз в сутки)

Литература: <sup>1</sup>Motzer R.J., Escudier B., Oudard S. et al; for the RECORD-1 Study Group. Efficacy of everolimus in advanced renal cell carcinoma: a double-blind, randomized, placebo-controlled phase III trial. Lancet. 2008; 372: 449-456. <sup>2</sup>Escudier B., Ravaud A., Oudard S. et. al.; for the RECORD-1 Study Group. Phase-3 randomized trial of everolimus (RAD001) vs placebo in metastatic renal cell carcinoma. 33rd ESMO Congress. September 12-16, 2008, Stockholm, Sweden. [Slide presentation] Abstract 720. <sup>3</sup>Kay A., Motzer R., Figlin R. et. al. Updated data from a Phase 3 randomized trial of everolimus (RAD001) vs PBO in metastatic renal cell carcinoma. 2009, Genitourinary Cancers Symposium. February 26-28, 2009. Orlando, Fl. Absrt № 278.

\*VEGF – сосудисто-эндотелиальный фактор роста.

\*\*MSKCC – шкала оценки факторов прогноза, разработанная Мемориальным онкологическим центром Слоуна–Кеттеринга.

Для получения детальной информации смотрите инструкцию по применению препарата

 NOVARTIS  
ONCOLOGY

За дополнительной информацией обращайтесь  
в представительство «Новартис Фарма Сервисез АГ» в Украине:  
02098, г. Киев, ул. Березняковская, 29.  
Тел.: (044) 490-53-38, факс: (044) 490-53-39.

  
**АФИНИТОР**  
(эверолимус) таблетки

UKR002020/2011 - SILWGX1