


# ОСНОВА лечения HER2-позитивного рака молочной железы



## Герцептин

принят в качестве обязательного стандарта лечения HER2-позитивного рака молочной железы во всем мире

достоверно увеличивает выживаемость на всех стадиях HER2-позитивного рака молочной железы

обеспечивает лучший шанс на излечение при терапии в течение 1 года HER2-позитивного рака молочной железы ранних стадий



**Состав:** 1 однодозовый флакон содержит трастузумаба 150 мг, 1 многодозовый флакон содержит трастузумаба 440 мг.

**Форма выпуска:** порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для инфузий.

**Фармакотерапевтическая группа:** антинеопластические моноклональные антитела.

**Показания:** 1. Терапия на ранних стадиях РМЖ с опухолевой гиперэкспрессией HER2:

- в виде адъювантной терапии: после проведения хирургического вмешательства, завершения неадъювантной и/или адъювантной химиотерапии, и/или лучевой терапии
  - в комбинации с паклитакселом или доцетакселом после адъювантной химиотерапии доксорубицином и циклофосфамидом
  - в комбинации с адъювантной химиотерапией, в состав которой входят доцетаксел и карбоплатин
2. Терапия метастатического РМЖ с опухолевой гиперэкспрессией HER2:
- в виде монотерапии после одной или более схем химиотерапии
  - в комбинации с паклитакселом или доцетакселом в случае отсутствия предшествующей химиотерапии (первая линия)
  - в комбинации с ингибиторами ароматазы или положительных гормональных рецепторов.

**Противопоказания:** повышенная чувствительность к трастузумабу или любому другому компоненту препарата, в т.ч. бензиловому спирту.

**Способ применения и дозы:** Герцептин вводят только внутривенно капельно. Недельная схема введения: нагрузочная доза — 4 мг/кг 1 раз в нед, поддерживающая доза – 2 мг/кг 1 раз в нед. Трехнедельная схема введения: нагрузочная доза – 8 мг/кг 1 раз в 3 нед, поддерживающая доза – 6 мг/кг 1 раз в 3 нед.

**Особые указания:** применение трастузумаба ассоциируется с кардиотоксичностью, всем пациентам до первого введения препарата и во время лечения должен проводиться кардиомониторинг.

**Условия отпуска:** по рецепту.

**Упаковка:** флаконы по 150 мг № 1 в картонной упаковке, флаконы по 440 мг № 1 вместе с растворителем (бактериостатическая вода для инъекций) во флаконе по 20 мл № 1 в картонной упаковке.

Информация для медицинских работников, март 2012 г.

Для получения полной информации по препарату см. инструкцию по медицинскому применению Герцептина.

Сертификат о гос. регистрации № 728/10 – 300200000 от 21.05.2010  
Приказ МЗ Украины от 21.02.2011 № 89

ООО «РОШ УКРАИНА»

01030, Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 19–21;

БЦ «Леонардо», 10-й этаж

Тел.: (044) 354-30-40; факс: (044) 354-30-41

www.roche.ua

UA.A.HER.01.06.12